

# Statistika v Biologii

Alena Černíková

[alena.cernikova@ujep.cz](mailto:alena.cernikova@ujep.cz)

5. února 2026

# Podmínky zápočtu

- **tři domácí úkoly**

jednoduché opakování příkladů ze cvičení  
odevzdávat přes moje internetové stránky – kapitola  
Statistika v Biologii, odkaz [Úkoly](#)  
důraz je kladen na interpretaci výsledků

- **seminární práce**

zpracování vzájemného vztahu tří proměnných  
souvislý text obsahující všechny podstatné statistické  
informace

# Obsah kurzu

- 1 Co je statistika
- 2 Popisné statistiky
- 3 Pravděpodobnostní rozdělení
- 4 Bodový a intervalový odhad
- 5 Testování hypotéz
- 6 Jednovýběrový, párový a dvouvýběrový test
- 7 Analýza rozptylu
- 8 Korelační koeficient a lineární regrese

# Co je statistika

## Statistika je přesná věda o nepřesných číslech.

Cílem je zjistit chování náhodné veličiny v určité populaci. Celou populaci změřit neumíme. Uděláme náhodný výběr, na kterém změříme sledovanou veličinu, a na základě zjištěných informací děláme závěry pro celou populaci.

**Příklad.** *Zajímá nás průměrná výška dospělých lidí v celé České republice. Všechny dospělé lidi změřit nemumíme, uděláme náhodný výběr o cca 200 lidech a na základě získaných výsledků se snažíme celkovou průměrnou výšku odhadnout. Průměrná výška pro těchto 200 lidí vyšla 175 cm.*

# Základní pojmy

- **Nahodná veličina** – jakákoliv veličina, kterou můžeme měřit opakovaně, např. výška
- **Populace** – soubor, pro nějž chceme udělat nějaký závěr, např. všichni dospělí obyvatelé České republiky
- **Náhodný výběr** – v porovnání s populací malý soubor pozorování získaný **náhodně**, jde o nezávislé, stejně rozdělené náhodné veličiny, např. výběr 200 lidí
- **Populační charakteristika** – charakteristika popisující populaci, např. populační průměr
- **Výberová charakteristika** – charakteristika spočítaná na výběru, pomocí níž odhadujeme populační ekvivalent, např. výběrový průměr.

# Čištění dat

## Problémy v datech – aneb co dělat když

- **Chybějící pozorování**

snažíme se, aby jich bylo co nejméně,  
když jich je málo, tak pracujeme bez nich – většina statistických  
metod implementovaných v různých softwarech si s tím poradí,  
je možné je doplnit na základě nějakého modelu (*imputation*)

- **Odlehlé hodnoty**

kontrola, zda nedošlo k chybě měření,  
pokud ne, tak z popisných statistik se většinou nevynechávají,  
ale je dobré zmínit, že se jedná o odlehlé hodnoty,  
pro popis proměnné je pak lépe zvolit ukazatele necitlivé na  
odlehlé pozorování,  
ze složitějších analýz se často vynechávají

# Typy proměnných

Náhodná veličina se často nazývá **proměnná**.

Abychom správně určili, které charakteristiky máme pro proměnnou počítat, je třeba nejprve určit její **typ**.

- **Číselné proměnné** – pr. výška, váha, věk, atd.
- **Kategorické proměnné** – pr. barva, kraj, povolání, nebo taky známka ve škole, číslo, které padne na kostce, atd.
- Kategorické proměnné se dále dělí na
  - **Nominální** – neuspořádané, př. barva, kraj
  - **Ordinální** – uspořádané, př. známka, číslo na kostce

# Popisné statistiky

Jak popisujeme jednotlivé typy proměnných

- **Číselné proměnné**

- popisné statistiky polohy – průměr, medián, vybrané percentily (kvartily, extrémy)
- popisné statistiky variability – rozptyl, směrodatná odchylka, mezikvartilové rozpětí, koeficient variace
- popisné statistiky tvaru rozdělení – šikmost, špičatost
- grafické charakteristiky – krabicový graf, histogram

- **Nominální proměnné**

- číselné charakteristiky – absolutní a relativní četnosti
- grafické charakteristiky – sloupcový a koláčový graf

- **Ordinální proměnné**

- lze použít jak průměr, medián atd.
- a pro malé počty kategorií i absolutní a relativní četnosti

# Popisné statistiky polohy

**Příklad.** *Mějme náhodný výběr 18-ti dospělých lidí a předpokládejme, že jsme u nich naměřili výšky 176, 184, 167, 193, 174, 182, 181, 179, 187, 165, 168, 172, 184, 178, 160, 168, 171, 159. Spočtěme průměr, medián, kvartily a extrémy.*

Jak vypočítat **průměr** z  $n$  hodnot značených  $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Jak vypočítat **medián**

- z uspořádané řady – hodnota prostřední podle velikosti, nebo průměr prostředních dvou hodnot

Jak vypočítat **kvartily**

- z uspořádané řady – hodnoty v jedné a ve třech čtvrtinách

Jak vypočítat **extrémy**

- minimum a maximum

# Popisné statistiky polohy

## Popisné statistiky polohy – výpočet kvartilů podle R

Výpočet pro obecný  $p$ -tý percentil – vážený průměr dvou sousedních uspořádaných hodnot.

Označme

- $p$  – díl dat, které chcete  $p$ -tým percentilem oddělit  
číslo mezi 0 a 1
- $X_{(k)}$  – hodnoty z uspořádané řady,  $k$ -tý nejmenší prvek
- $q$  – koeficient, kterým se násobí uspořádané hodnoty do váženého průměru

$$p\text{-ty percentil} = (1 - q)X_{(k)} + qX_{(k+1)}$$

$$k = \lfloor 1 + (n - 1)p \rfloor$$

$$q = 1 + (n - 1)p - k$$

# Grafické popisné statistiky

Pro popis číselné proměnné se používají 2 typy grafů

- **Krabicový graf**

jsou v něm zobrazeny vybrané percentily (medián a kvartily), tykadla dosahují k nejvzdálenějšímu neodlehlému pozorování (odlehlá pozorování se vyznačují zvlášť)

*odlehlé pozorování* je takové, které je od bližšího kvartilu dále než jeden a půl násobek mezikvartilového rozpětí  $1.5(Q_3 - Q_1)$

- **Histogram**



počet sloupců je určen vybraným pravidlem  
nejčastěji se používá *Sturgesovo pravidlo*

$$k = 1 + 3.32 \log_{10}(n)$$

kde  $n$  je počet pozorování

# Grafické popisné statistiky

## Ukázka grafů pro číselnou proměnnou



# Popisné statistiky variability

- Rozptyl a **směrodatná odchylka**

$$\text{Var}(X) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}, \quad \text{sd}(X) = \sqrt{\text{Var}X}$$

- základní charakteristika variability
- směrodatná odchylka je ve stejných jednotkách jako proměnná
- popisuje, jak moc se pozorování liší od průměru
- citlivé na odlehlé hodnoty
- v intervalu  $\bar{X} \pm \text{sd}(X)$  se nachází cca 2/3 pozorování

# Popisné statistiky variability

- **Mezikvartilové rozpětí**

$$IQR(X) = Q_3 - Q_1$$

kde  $Q_3$  je třetí kvartil a  $Q_1$  je první kvartil

- šíře intervalu, kde je prostřední polovina dat
- výška krabice v krabicovém grafu
- **robustní** (necitlivé) vůči odlehlým hodnotám

# Popisné statistiky variability

## • **Variační koeficient**

$$V(X) = \frac{sd(X)}{\bar{X}}$$

- porovnává velikost variability (směrodatné odchyly vůči průměru)
- kolikrát je směrodatná odchylna větší než průměr
- bezrozměrná veličina
- často se udává v procentech
- hodí se pro porovnání variability různých veličin mezi sebou

# Popisné statistiky tvaru rozdělení

Základem pro výpočet jsou tak zvané **Z-skóry**

$$Z_i = \frac{X_i - \bar{X}}{\text{sd}(X)}$$

- standardizované proměnné
- jejich průměr je 0 a rozptyl 1
- 99% z nich se nachází v intervalu  $< -3, 3 >$
- používají se kdekoli, kde chci srovnat proměnné na stejnou škálu

# Popisné statistiky tvaru rozdělení

- **Šikmost** – průměr ze třetích mocnin z-skórů

$$\text{Skew}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{X_i - \bar{X}}{\text{sd}(X)} \right)^3 = \frac{\sum_{i=1}^n Z_i^3}{n}$$

- hodnotí symetrii dat
  - **nula** ... symetrická data
  - **záporná** hodnota ... protažení doleva
  - **kladná** hodnota ... protažení doprava
- rozdělení přibližně symetrické má šikmost v rozmezí  $< -0.25; 0.25 >$

# Popisné statistiky tvaru rozdělení


- **Špičatost** – průměr ze čtvrtých mocnin z-skórů minus 3

$$\text{Kurt}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{X_i - \bar{X}}{\text{sd}(X)} \right)^4 - 3 = \frac{\sum_{i=1}^n Z_i^4}{n} - 3$$


- porovnává špičatost vůči normálnímu rozdělení
  - **nula** ... normální rozdělení
  - **záporná** hodnota ... plošší než normální rozdělení
  - **kladná** hodnota ... špičatější než normální rozdělení
- přibližně normální rozdělení má špičatost v intervalu  $< -0.5; 0.5 >$

# Popisné statistiky tvaru rozdělení

## Ukázka záporné, nulové a kladné šikmosti



## Ukázka záporné, nulové a kladné špičatosti



# Popisné statistiky výšky

```
> numSummary(Kojeni[, "vyskaM", drop=FALSE], statistics=c("mean", "sd", "se(mean)",
  "IQR", "quantiles", "cv", "skewness", "kurtosis"), quantiles=c
  (0,.25,.5,.75,1), type="3")
      mean      sd se(mean)  IQR      cv skewness kurtosis    0%  25%  50%  75% 100% n
166.9697  6.1103  0.6141    7 0.0366   0.0215  0.2156   153 164 167 171 187 99
```

## Popisné statistiky polohy

- průměr: mean = 166.97 cm
- minimum: 0% = 153 cm
- maximum: 100% = 187 cm
- medián: 50% = 167 cm
- dolní kvartil: 25% = 164 cm
- horní kvartil: 75% = 171 cm

počet pozorování:  $n = 99$

## Popisné statistiky variability

- směrodatná odchylka: sd = 6.11 cm
- střední chyba průměru: se(mean) = 0.6141 cm
- mezikvartilové rozpětí: IQR = 7 cm
- variační koeficient: CV = 0.0366

## Popisné statistiky tvaru rozdělení

- šikmost: skewness = 0.0215
- špičatost: kurtosis = 0.2156

# Číselné popisné statistiky

**Příklad.** Mějme náhodný výběr 10-ti dospělých lidí a předpokládejme, že jsme u nich zjišťovali barvu očí. Ve výběru jsme rozlišovali 3 barvy: modrá (M), hnědá (H) a zelená (Z). Zjistili jsme následující barvy M, M, Z, H, H, H, M, Z, M, H. Popišme zjištěné výsledky.

Tabulka absolutních a relativních četností.



| Barva  | Absolutní | Relativní (%) |
|--------|-----------|---------------|
| Modrá  | 4         | 40%           |
| Hnědá  | 4         | 40%           |
| Zelená | 2         | 20%           |
| Celkem | 10        | 100%          |

Označme  $n_j$  četnosti v jednotlivých kategoriích a  $n$  celkový počet pozorování, pak **relativní četnost**  $p_j$  spočteme jako

$$p_j = \frac{n_j}{n}$$

# Grafické popisné statistiky

Sloupcový a koláčový graf – je možné je popisovat v absolutních počtech, nebo v procentech



# Popisné statistiky barvy očí

```
> local({  
  .Table <- with(Data, table(BarvaOci))  
  cat("\ncounts:\n")  
  print(.Table)  
  cat("\npercentages:\n")  
  print(round(100*.Table/sum(.Table), 2))  
})
```

```
counts:  
BarvaOci  
Hneda Modra Zelena  
4      4      2
```

```
percentages:  
BarvaOci  
Hneda Modra Zelena  
40     40    20
```

## Popisné statistiky kategorické proměnné

- absolutní četnosti: counts
- relativní četnosti: percentages

# Pravděpodobnostní rozdělení

Pravděpodobnostní rozdělení popisuje pravděpodobnosti možných výsledků náhodného pokusu.

- **Náhodný pokus:** pokus konaný za přesně daných podmínek, o němž není dopředu známo jak dopadne  
Př. hod kostkou, měření výšky lidí, výsledek studenta u zkoušky
- **Náhodný jev:** možný výsledek náhodného pokusu  
Př. na kostce padne sudé číslo, výška člověka bude větší než 170 cm, student zkoušku udělá
- **Elementární jev:** nejmenší náhodné jevy, které nemohou nastat současně, ale musí nastat vždy alespoň jeden z nich  
Př. na kostce padne 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6, výška člověka bude 160 cm, student zkoušku udělá nebo neudělá
- Součet všech elementárních jevů je prostor všech možných výsledků náhodného pokusu

## Příklad

**Příklad.** *Házíme dvěma šestistěnnými kostkami, červenou a modrou. Elementární jevy jsou všechny možné dvojice hodnot  $(1,1)$ ,  $(1,2)$ ,  $(1,3)$ ,  $\dots$ ,  $(6,5)$ ,  $(6,6)$ . Celkem jich je 36. Nás zajímají pravděpodobnosti následujících náhodných jevů.*

- *Na červené kostce padne liché číslo*
- *Na modré kostce padne číslo dělitelné třemi*
- *Součet na obou kostkách bude větší nebo rovno 10*

Jak se vypočte **pravděpodobnost náhodného jevu  $A$** ?

$$P(A) = \frac{\text{počet příznivých možností}}{\text{počet všech možností}}$$

# Náhodné jevy

- **Jev jistý**  $\Omega$ : soubor všech elementárních jevů, tj. celý prostor možných výsledků,  $P(\Omega) = 1$   
*Př. na kostce padne číslo od jedné do šesti*
- **Jev nemožný**  $\emptyset$ : jev, který neobsahuje ani jeden elementární jev,  $P(\emptyset) = 0$   
*Př. na kostce padne mínus jedna*
- **Jev opačný** k jevu  $A$ , tj.  $\bar{A}$ : soubor elementárních jevů, které nastanou právě když nenastane jev  $A$ ,  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$   
*Př. na kostce padne sudé číslo, a na kostce padne liché číslo*
- **Neslučitelné jevy**: jevy  $A$  a  $B$  jsou neslučitelné, když mají prázdný průnik  
*Př. na kostce padne sudé číslo, a na kostce padne 1*
- **Podjev**: jev  $A$  je podjevem jevu  $B$ , když je jeho částí  
*Př. na kostce padne liché číslo a na kostce padne 3*

# Vztah dvou jevů

- **Podmíněná pravděpodobnost:** hledáme pravděpodobnost jevu  $A$  za podmínky že víme, že nastal jev  $B$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Předpokládáme  $P(B) > 0$ .

**Př.** *jaká je pst, že součet bodů na dvou kostkách je větší nebo rovno 10, když víme, že na modré kostce padlo sudé číslo.*

- **Nezávislost jevů:** jevy  $A$  a  $B$  jsou nezávislé, když

$$P(A) = P(A|B)$$

nebo jinak zapsáno

$$P(A)P(B) = P(A \cap B)$$

**Př.** *jsou jevy "na červené kostce padne liché číslo" a "na modré kostce padne číslo dělitelné třemi" nezávislé*

# Věta o celkové pravděpodobnosti

- Chceme spočítat pst jevu  $A$ , když známe pouze podmíněné psti  $P(A|H_i)$ , kde  $H_i$  jsou neslučitelné jevy, jejichž sjednocení je jev jistý, tj.  $H_1 \cup H_2 \cup \dots \cup H_k = \Omega$  a  $H_i \cap H_j = \emptyset$  pro všechna  $i, j$

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(A|H_i)P(H_i)$$

- prostor všech jevů si rozdělíme na části (např. populaci na muže a ženy)
- v každé z nich spočítáme pravděpodobnost jevu  $A$  (např. pst. že člověk vystuduje vysokou školu)
- pst jevu  $A$  v celém prostoru/ populaci je pak součet pstí v jednotlivých částech (podmíněné psti) krát velikost (pravděpodobnost) těchto částí
- tj. pst, že člověk vystuduje VŠ můžeme spočítat jako pst, že muž vystuduje VŠ krát pst, že dotyčný je muž, plus pst, že žena vystuduje VŠ krát pst, že dotyčný je žena

# Bayesův vzorec

- Jak vypočítat podmíněnou pravděpodobnost  $P(A|B)$  ze znalosti  $P(B|A)$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A})}$$

neboli vzorec v obecné podobě

$$P(H_i|A) = \frac{P(A|H_i)P(H_i)}{\sum_{j=1}^k P(A|H_j)P(H_j)}$$

pravděpodobnosti  $P(H_i)$  se nazývají *apriorní* a pravděpodobnosti  $P(H_i|A)$  *aposteriorní*

- podle vzorce pro výpočet podmíněné pravděpodobnosti je v čitateli pravděpodobnost průniku jevů

$$P(A \cap B) = P(B|A)P(A)$$

- podle vzorce pro úplnou pravděpodobnost je ve jmenovateli pravděpodobnost jevu  $B$

# Senzitivita a specificita testu

Charakteristiky medicínských testů označují podmíněné pravděpodobnosti

- **Senzitivita testu:** pravděpodobnost, že test vyjde pozitivně, pokud je osoba nemocná  
 $P(\text{test je pozitivní} | \text{osoba je nemocná})$
- **Specificita testu:** pravděpodobnost, že test vyjde negativně, pokud je osoba zdravá  
 $P(\text{test je negativní} | \text{osoba je zdravá})$

# Senzitivita a specifická testu

**Příklad.** Výzkumu se zúčastnilo 2000 pacientů, z nichž 50 bylo HIV pozitivních. Všichni podstoupili test na HIV. Test vyšel pozitivní pro 45 pozitivních pacientů a pro 200 negativních. Spočítejte senzitivitu a specificku testu a také pravděpodobnost, že člověk bude skutečně HIV pozitivní, pokud mu vyjde pozitivní test.

|        |           | Skutečnost |           |        |
|--------|-----------|------------|-----------|--------|
|        |           | Pozitivní  | Negativní | Celkem |
| Test   | Pozitivní | 45         | 200       | 245    |
|        | Negativní | 5          | 1750      | 1755   |
| Celkem |           | 50         | 1950      | 2000   |

- **Senzitivita testu:**  $P(\text{test je pozitivní} | \text{osoba je nemocná}) = 45/50 = 0.9$
- **Specifická testu:**  $P(\text{test je negativní} | \text{osoba je zdravá}) = 1750/1950 = 0.897$
- **Jsem nemocný, když mám pozitivní test?:**

$$P(\text{osoba je nemocná} | \text{test je pozitivní}) = 45/245 = 0.184$$

Pomocí Bayesovy věty

$$\begin{aligned}
 P(ON|TP) &= \frac{P(ON \cap TP)}{P(TP)} = \frac{P(TP|ON)P(ON)}{P(TP|ON)P(ON) + P(TP|OZ)P(OZ)} = \\
 &= \frac{\text{Senzitivita} * \text{podíl nemocných}}{\text{Senzitivita} * \text{podíl nemocných} + (1 - \text{Specifická}) * \text{podíl zdravých}} = \frac{0.9 * 0.025}{0.9 * 0.025 + 0.102 * 0.975} = 0.184
 \end{aligned}$$

# Pravděpodobnostní rozdělení

Pravděpodobnostní rozdělení dělíme podle typu proměnné na

- **Spojitá:** pro číselné proměnné nabývající všech reálných hodnot v určitém intervalu,  
př. normální, exponenciální, chí-kvadrát, ...
- **Diskrétní:** pro číselné proměnné které nabývají jasně oddělitelných hodnot  
mohou nabývat i nekonečně hodnot, nejčastěji počty  
př. binomické, poissonovo, alternativní, ...

# Funkce určující rozdělení

- **Distribuční funkce:**  $F(t) = P(X \leq t)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ 
  - neklesající, zprava spojitá, obor hodnot je mezi 0 a 1
  - definovaná pro všechna rozdělení
- **Pravděpodobnostní funkce:**  $p(t) = P(X = t)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ 
  - definovaná pouze pro diskrétní rozdělení
  - nespojitá, nenulová jen v hodnotách, kterých může náhodná veličina nabývat
- **Hustota:**  $f(t) = \frac{d}{dt} F(t)$ 
  - definovaná pouze pro spojitá rozdělení
  - obdoba pravděpodobnostní funkce, ale nedefinuje konkrétní pravděpodobnosti
  - pravděpodobnost jedné konkrétní hodnoty u spojitého rozdělení je 0
  - derivace funkce distribuční

# Střední hodnota a rozptyl

**Další charakteristiky** pro diskrétní i spojitá rozdělení

- Střední hodnota

$$E(X) = \sum_{i=1}^n X_i p_i,$$

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

- Rozptyl

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n (X_i - E(X))^2 p_i$$

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f(x)dx$$

# Binomické rozdělení (diskrétní)

Mějme náhodný pokus, který může skončit jedním ze dvou výsledků: úspěch – neúspěch. Opakujme tento pokus mnohokrát a počítejme počet úspěchů. Počet úspěchů má binomické rozdělení.

**Značení**  $Bi(n, p)$ , kde

- $n$  – počet pokusů,
- $p$  – pravděpodobnost úspěchu

Hodnoty **pravděpodobnostní funkce**

$$p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

**Střední hodnota a rozptyl**



$$E(X) = np,$$

$$\text{Var}(X) = np(1 - p)$$

# Binomické rozdělení (diskrétní)

**Příklad.** *Házíme 10x mincí a počítáme, kolikrát padla panna. Počet pokusů je  $n = 10$ , pravděpodobnost úspěchu  $p = 1/2$ . Máme tedy rozdělení  $Bi(10, 1/2)$ .*

**Pravděpodobnostní a distribuční funkce.**



**Střední hodnota a rozptyl**

$$E(X) = np = 10 \frac{1}{2} = 5,$$

$$\text{Var}(X) = np(1 - p) = 10 \frac{1}{2} \frac{1}{2} = 2.5$$

# Normální rozdělení (spojité)

Znamé rozdělení s hezkými vlastnostmi. Toto rozdělení má výška lidí určitého věku, IQ, ....

**Značení**  $N(\mu, \sigma^2)$ , kde

- $\mu$  – střední hodnota
- $\sigma^2$  – rozptyl

**Hustota** normálního rozdělení má tvar



$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

Je to tak zvaná **Gaussova křivka**.

Ve statistice se nejčastěji používá standardní normální rozdělení  $N(0, 1)$ .

# Normální rozdělení (spojité)

Vztah mezi hustotou a distribuční funkcí u standardního normálního rozdělení  $N(0, 1)$ . Červeně je na obou grafech zobrazena stejná hodnota.





# Testování normality

- normální, neboli Gaussovo rozdělení je ve statistice stěžejní
- objevuje se v běžném životě (výška, IQ, hmotnost bochníku chleba, atd)
- **základní statistické postupy**, které budeme brát na tomto kurzu, jsou založené na normálním rozdělení
- je potřeba umět normalitu **otestovat**

# Grafické testy normality

- základní grafické testy jsou histogram a **pravděpodobnostní graf**



- histogram by měl mít tvar Gaussovy křivky
- v pravděpodobnostním grafu by body měly ležet na přímce

# Číselné testy normality

- normalitu lze odhadovat i z popisných statistik tvaru rozdělení: šikmost i špičatost by měly být blízko nuly
- příklady číselných testů Shapiro-Wilkův, Andersonův-Darlingův, Kolmogorovův-Smirnovův, Lillieforsův a další
- tyto testy vrací p-hodnotu
- pokud je **p-hodnota větší než 0.05, pak data mají přibližně normální rozdělení**



# Centrální limitní věta

## Věta

*Rozdělení součtu nezávislých, stejně rozdělených náhodných veličin konverguje k normálnímu pro počet těchto náhodných veličin rostoucí nade všechny meze.*

Tedy: čím více hodnot sčítáte/průměrujete, tím spíše bude mít průměr normální rozdělení.

Ukázka, jak vypadá rozdělení průměru 30-ti hodnot z beta rozdělení v porovnání s rozdělením samotným.



# Bodový odhad střední hodnoty

**Příklad.** *Mějme situaci, kdy potřebujeme odhadnout průměrnou výšku dospělých lidí v celé České republice. Náhodně jsme vybrali a změřili 500 lidí. Výběrový průměr vyšel 173.12 cm a výběrová směrodatná odchylka 8.9 cm. Odhadněte populační průměr výšky dospělých lidí.*

- **nejlepší bodový odhad** je výběrový průměr  $\bar{X} = 173.12$  cm
- jaká je pravděpodobnost, že se populační průměr bude rovnat přesně tomuto číslu?
- chyba odhadu, tzv. **střední chyba odhadu průměru**

$$\text{SEM} = \frac{\text{sd}(X)}{\sqrt{n}}$$

# Intervalový odhad střední hodnoty

Chceme interval, ve kterém se s vysokou pravděpodobností bude nacházet populační průměr/ skutečná střední hodnota. Z čeho se interval spolehlivosti počítá

- **Výběrový průměr**: leží ve středu intervalu spolehlivosti
- **Výběrový rozptyl**: čím větší variabilitu výběr má, tím širší bude interval spolehlivosti
- **Počet pozorování**: čím více pozorování, tím přesnější odhad mám a tím užší bude interval spolehlivosti
- **Požadovaná spolehlivost**: čím spolehlivější výsledek chci, tj. čím větší pravděpodobnost, že výběrový průměr bude ležet uvnitř intervalu spolehlivosti, tím širší interval dostanu

# Intervalový odhad střední hodnoty

Výběrový průměr má normální rozdělení

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

- $\mu$  je teoretická střední hodnota
- $\sigma$  je teoretická směrodatná odchylka
- $n$  je počet pozorování
- $N(0, 1)$  je standardní normální rozdělení

Interval spolehlivosti pro střední hodnotu, když **znám** skutečný **rozptyl** dat

$$\bar{X} \pm z(1 - \alpha/2)\sigma/\sqrt{n}$$

- $z(1 - \alpha/2)$  je kvantil standardního normálního rozdělení

# Intervalový odhad střední hodnoty

Běžnější je případ, že **rozptyl neznám** a musím ho nahradit výběrovou směrodatnou odchylkou. Pak platí

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\text{sd}(X)/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

- $t_{n-1}$  značí  $t$ -rozdělení o  $n - 1$  stupních volnosti

meze intervalu spolehlivosti jsou

$$\bar{X} \pm t_{n-1}(1 - \alpha/2)\text{sd}(X)/\sqrt{n}$$

- $t_{n-1}(1 - \alpha/2)$  je kvantil  $t$ -rozdělení o  $n - 1$  stupních volnosti
- kvantily  $t$ -rozdělení jsou větší než kvantily normálního rozdělení
- interval spolehlivosti je širší než v předchozím případě

# Intervalový odhad střední hodnoty

V R-ku je interval spolehlivosti pro průměr součástí výstupu k jednovýběrovému testu

```
> with(Ichs, (t.test(hmot, alternative='two.sided', mu=0.0, conf.level=.95)))
```

One Sample t-test

data: hmot

t = 110.46, df = 203, p-value < 2.2e-16

alternative hypothesis: true mean is not equal to 0

95 percent confidence interval:

80.64702 83.57847

sample estimates:

mean of x

82.11275

**Interval spolehlivosti**

- S spolehlivostí 95% se skutečný populační průměr hmotnosti mužů nachází v intervalu od 80.65 kg do 83.58 kg
- v nastavení t-testu je možné měnit i požadovanou spolehlivost (Confidence level)
- důležité je nastavení oboustranné alternativy

# Intervalový odhad pravděpodobnosti

Chceme odhadnout parametr binomického rozdělení ( $p$ ).

**Příklad.** *Házíme 100 krát kostkou, z těchto 100 hodů mi šestka padla 20 krát. Jaká je pravděpodobnost, že padne 6.*

- **nejlepším bodovým odhadem** je relativní četnost  $\hat{p} = n_u/n$ 
  - $n_u$  je počet úspěchů
  - $n$  je počet pokusů
- **intervalový odhad** vychází z předpokladu, že

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n}} \sim N(0, 1)$$

pro  $n\hat{p}(1 - \hat{p}) > 9$

- meze intervalu spolehlivosti jsou

$$\hat{p} \pm z(1 - \alpha/2) \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n}$$


# Zákon velkých čísel

## Věta

*Mějme  $X_1, X_2, \dots$  posloupnost nezávislých, stejně rozdělených náhodných veličin s konečnou střední hodnotou  $E(X_i) = \mu < \infty$ . Pak výběrový průměr těchto veličin  $\overline{X}_n$  konverguje k jejich střední hodnotě  $\mu$  pro  $n$  rostoucí nade všechny meze.*

Tedy: čím více hodnot průměrujete, tím blíže bude tento průměr k odhadovanému parametru.

Ukázka, jak vypadá konvergence k parametru  $p$  u hodu mincí.



# Základy testování hypotéz

**Testování hypotéz** se využívá, když potřebujeme ověřit platnost nějakého tvrzení, např.

- Nový lék je lepší než ten stávající.
- Průměrná výška lidí je 175 cm.
- Průměrná výška lidí se za posledních 50 let zvýšila.
- Výnosy z jednotlivých druhů jabloní se liší.
- Krevní tlak závisí na hmotnosti.

# Testované hypotézy

Při statistickém rozhodování testujeme proti sobě 2 hypotézy

- **Nulovou hypotézu** – značíme  $H_0$ 
  - je v ní vždy pouze jedna varianta, např.
    - nový lék je stejný jako ten stávající (rozdíl je roven nule)
    - výška se rovná 175 cm
    - výnosy všech druhů jabloní jsou stejné (rozdíl je roven nule)
- **Alternativní hypotézu** – značíme  $H_1$ 
  - obsahuje více možností (interval hodnot), např.
    - nový lék je lepší než ten stávající (rozdíl je větší než nula)
    - výška se liší od 175 cm
    - výnosy druhů jabloní se liší (rozdíl se nerovná nule)

# Testované hypotézy

Nejčastěji testované dvojice hypotéz

- **Porovnání výběrů / skupin**
  - $H_0$ : mezi skupinami není rozdíl
  - $H_1$ : mezi skupinami je rozdíl
- **Test nezávislosti**
  - $H_0$ : proměnné spolu nesouvisí
  - $H_1$ : proměnné spolu souvisí
- k výše uvedeným nulovým hypotézám připadají v úvahu i jednostranné alternativy

# Závěr testu

Na základě statistického testu uděláme jedno ze dvou rozhodnutí

- **Zamítneme nulovou hypotézu**
  - tím jsme prokázali platnost alternativy
- **Nezamítneme nulovou hypotézu**
  - tím jsme neprokázali nic

Jiný závěr udělat nemohu, z čehož plyne, že

- to co mě zajímá (to, co chci prokázat), **musí být v alternativě**
- platnost nulové hypotézy nelze prokázat
- na interpretaci závěru testu je kladen speciální důraz

# Chyby při testování hypotéz

Při rozhodování můžeme udělat chybu

- **chyba prvního druhu**: zamítneme  $H_0$ , přestože platí
  - značí se  $\alpha$ , a jmenuje se **hladina významnosti**
  - závažnější z obou chyb
- **chyba druhého druhu**: nezamítneme  $H_0$ , přestože neplatí
  - značí se  $\beta$  a hodnota  $1 - \beta$  se nazývá síla testu
  - za dané hladiny významnosti chceme test co nejsilnější

|                  | Skutečně platí $H_0$            | Skutečně platí $H_1$       |
|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Zamítáme $H_0$   | Chyba I. druhu<br>$\leq \alpha$ | OK<br>síla testu           |
| Nezamítáme $H_0$ | OK                              | Chyba II. druhu<br>$\beta$ |

# Postup testování

Podle toho, co testujeme a podle typu dat vybereme vhodný statistický test, kterým budeme o platnosti testovaných hypotéz rozhodovat. Rozhodnutí můžeme udělat buď na základě

- porovnání **testové statistiky** ( $T$ ) a kritické hodnoty ( $c$ )
- porovnání  **$p$ -hodnoty** a hladiny významnosti ( $\alpha$ )

Platí, že

- absolutní hodnota testové statistiky  $|T| \geq c$  nebo  $p\text{-hodnota} \leq \alpha$  potom **ZAMÍTÁME  $H_0$**
- absolutní hodnota testové statistiky  $|T| < c$  nebo  $p\text{-hodnota} > \alpha$  potom **NEZAMÍTÁME  $H_0$**

# P-hodnota

- s testovou statistikou se většinou pracuje při ručním výpočtu
  - testovou statistiku je možné ručně spočítat a kritické hodnoty jsou tabelovány
- statistické softwary vrací jako výsledek testu **p-hodnotu**
- p-hodnota se také nazývá *aktuální dosažená hladina testu*
- počítá se kombinací hodnoty testové statistiky a příslušné kritické hodnoty
- **definice** p-hodnoty
  - pravděpodobnost, že za platnosti  $H_0$  nastal výsledek, jaký nastal, nebo jakýkoliv jiný, který ještě více odpovídá alternativě

# Testované hypotézy

Nejjednodušším testem je **jednovýběrový test o střední hodnotě**.

Testujeme nulovou hypotézu

- $H_0$  : střední hodnota =  $\mu_0$

Proti jedné ze tří alternativ

- $H_1$  : střední hodnota  $\neq \mu_0$
- $H_1$  : střední hodnota  $< \mu_0$
- $H_1$  : střední hodnota  $> \mu_0$

Není-li řečeno jinak, testujeme na hladině významnosti

$$\alpha = 0.05$$

# Testová statistika

**Testová statistika** jednovýběrového t-testu je

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\text{sd}(X)} \sqrt{n}$$

- za platnosti nulové hypotézy má  $t$ -rozdělení o  $n - 1$  stupních volnosti
- její hodnotu porovnáváme s kvantily  $t$ -rozdělení (kritické hodnoty)
- je-li rozdíl mezi tím, co jsme naměřili ( $\bar{X}$ ) a nulovou hypotézou  $\mu_0$  příliš velký, nulovou hypotézu **ZAMÍTÁME**

**Předpokladem** jednovýběrového t-testu je, že průměr testované veličiny má normální rozdělení (díky CLV většinou splněno).

# Jednovýběrový t-test

**Příklad.** *Bylo změřeno 222 jedenáctiletých dětí. Průměrná výška tohoto výběru je 148.8 cm, a směrodatná odchylka výšky vyšla 7.1. Dá se předpokládat, že průměrná výška všech jedenáctiletých dětí v republice je menší než 150 cm?*

## Testované hypotézy

- $H_0$  : průměrná výška = 150 cm
- $H_1$  : průměrná výška < 150 cm

Testujeme na hladině významnosti  $\alpha = 0.05$ .

# Jednovýběrový t-test

```
> with(Deti, (t.test(vyska11, alternative='less', mu=150, conf.level=.95)))
```

One Sample t-test

data: vyska11

t = -2.5618, df = 221, p-value = 0.005539

alternative hypothesis: true mean is less than 150

95 percent confidence interval:

-Inf 149.5664

sample estimates:

mean of x

148.7793

**Testová statistika**

**P-hodnota**

**Výběrový průměr**

# Jednovýběrový t-test

## Vyhodnocení testu

- testová statistika vyšla

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\text{sd}(X)} \sqrt{n} = \frac{148.8 - 150}{7.1/\sqrt{222}} = -2.5618$$

- porovnáám ji s kvantilem  $t$ -rozdělení  $t_{221}(1 - 0.05) = 1.65$
- jelikož  $|T| = 2.5618 > 1.65$ , tak **nulovou hypotézu zamítáme**
- $p$ -hodnota vyšla  $p = 0.005 < 0.05 \Rightarrow$  zamítáme  $H_0$
- nakonec je potřeba ověřit normalitu

**Závěr:** Prokázali jsme, že průměrná výška jedenáctiletých dětí je menší než 150 cm.

# Párový test

**Párový test** se používá v případě, že porovnáváme střední hodnotu ve dvou **závislých** výběrech.

Např.

- *Jsou otcové v průměru o 10 cm vyšší než matky?*
- *Mají praváci silnější pravou ruku než levou?*
- *Klesl pacientům po podání léku krevní tlak?*

Ať je otázka formulována jakkoliv, tak test porovnává průměrné hodnoty. Vyjde nám tedy odpověď, jak je to "v průměru".

Závislé výběry poznám tak, že data tvoří **přirozené páry**.

# Párový t-test

Při aplikaci testu je důležité udržet párová data u sebe, (abyste neporovnávali Vaší pravou ruku se sousedovou levou).

## Postup testování

- V prvním kroku jsou pro všechny páry vypočteny **rozdíly**:

$$R_i = X_i - Y_i$$

- střední hodnota těchto rozdílů je testována jednovýběrovým testem

# Párový t-test

**Příklad.** Bylo měřeno 222 dětí v jedenáctém a dvanáctém roce věku. Průměrná výška jedenáctiletých vyšla 148.8 cm, u dvanáctiletých pak 154.9 cm. Směrodatná odchylka u jedenáctiletých vyšla 7.1 cm, u dvanáctiletých pak 7.9 cm. Průměrná hodnota rozdílů výšek vyšla 6.1 cm a směrodatná odchylka 2.8 cm. Vyrostly děti mezi jedenáctým a dvanáctým rokem v průměru alespoň o 5 cm?

Testované hypotézy

- $H_0$  : výška ve 12 letech – výška v 11 letech = 5 cm
- $H_1$  : výška ve 12 letech – výška v 11 letech > 5 cm

# Párový t-test

## Vyhodnocení testu

- Do testové statistiky vkládáme charakteristiky rozdílu (tedy nikoliv rozdíl průměrů, ale průměr rozdílů).

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\text{sd}(X)} \sqrt{n} = \frac{6.1 - 5}{2.8} \sqrt{222} = 5.9$$

- porovnáváme ji s kvantilem t-rozdělení  
 $t_{221}(1 - 0.05) = 1.65$
- jelikož  $|T| = 5.9 > 1.65$  tak, **nulovou hypotézu zamítáme**
- $p$ -hodnota vyšla  $p = 7.26 \times 10^{-9} < 0.05 \Rightarrow$  zamítáme  $H_0$
- nakonec je potřeba ověřit normalitu rozdílu

**Závěr:** Prokázali jsme, že mezi jedenáctým a dvanáctým rokem děti vyrostly v průměru o více než o 5 cm.

# Dvouvýběrový test

Porovnáváme-li střední hodnotu dvou **nezávislých** výběrů, používá se **dvouvýběrový test**.

Příklady

- Je nový lék lepší než ten stávající?
- Jsou muži vyšší než ženy?
- Liší se od sebe dva druhy hnojiva?

Testované hypotézy

- $H_0$  : průměr 1. skupiny – průměr 2. skupiny =  $\mu_0$
- $H_1$  : průměr 1. skupiny – průměr 2. skupiny  $\neq \mu_0$ ,  
 $> \mu_0, < \mu_0$

Dvouvýběrový test testuje rozdíl průměrů.

# Dvouvýběrový $t$ -test

Budeme zde brát dva typy dvouvýběrového testu:

- Dvouvýběrový  $t$ -test pro shodné rozptyly
- Welchův dvouvýběrový test pro různé rozptyly

Oba tyto testy **předpokládají** normální rozdělení obou průměrů.

# Test shody rozptylů

K tomu, abychom mohli vybrat správnou verzi testu, je potřeba otestovat **shodu rozptylů** v obou výběrech.

Testované hypotézy

- $H_0$  : rozptyly se ve výběrech neliší
- $H_1$  : rozptyly se ve výběrech liší

Testová statistika je

$$F = \frac{\text{Var}(X)}{\text{Var}(Y)}$$

za platnosti  $H_0$  má  $F$ -rozdělení o  $n_1 - 1$  a  $n_2 - 1$  stupních volnosti, kde  $n_1, n_2$  jsou rozsahy prvního, respektive druhého výběru.

# Dvouvýběrový t-test pro shodné rozptyly

Testová statistika testu má tvar

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \mu_0}{S} \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}}$$

kde

$$S = \frac{1}{n_1 + n_2 - 2} \left( \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2 \right)$$

za platnosti nulové hypotézy má tato statistika  $t$ -rozdělení o  $n_1 + n_2 - 2$  stupních volnosti.

# Welchův t-test

Testová statistika testu má tvar

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\text{Var}(X)}{n_1} + \frac{\text{Var}(Y)}{n_2}}}$$

a za platnosti nulové hypotézy má  $t$ -rozdělení o  $\nu$  stupních volnosti, kde


$$\nu = \frac{(\text{Var}(X)/n_1 + \text{Var}(Y)/n_2)^2}{\frac{(\text{Var}(X)/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(\text{Var}(Y)/n_2)^2}{n_2-1}}.$$

kritické hodnoty je možno odvodit, přestože  $\nu$  není celé číslo.

# Dvouvýběrový t-test

**Příklad.** Ve výběru mám 204 mužů středního věku. Z nich 109 kouří a 95 nekouří. Cílem výzkumu je zjistit, zda se Body Mass Index (BMI) liší u kuřáků a nekuřáků. Průměrné BMI u kuřáků je 25.95 se směrodatnou odchylkou 2.8. U nekuřáků je průměrné BMI 26.98 a směrodatná odchylka 3.1.

## Grafické porovnání



# Test shody rozptylů

## Testované hypotézy

- $H_0$  : rozptyly ve skupinách jsou stejné
- $H_1$  : rozptyly se ve skupinách liší

## Vyhodnocení testu

- test shody rozptylů má testovou statistiku

$$F = \frac{\text{Var}(X)}{\text{Var}(Y)} = \frac{7.84}{9.5} = 0.825$$

- p-hodnota vyšla  $p = 0.3325 > 0.05$  a **nulovou hypotézu nezamítáme**
- rozptyly ve skupinách jsou přibližně stejné
- můžeme použít dvouvýběrový t-test pro shodné rozptyly

# F-test shody rozptylů

```
> var.test(BMI ~ Koureni, alternative='two.sided', conf.level=.95, data=Ichs)
```

F test to compare two variances

data: BMI by Koureni

F = 0.82514, num df = 108, denom df = 94, p-value = 0.3335

alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1

95 percent confidence interval:

0.5553633 1.2193409

sample estimates:

ratio of variances

0.8251421

**Testová statistika**

**P-hodnota**

**Interval spolehlivosti pro podíl rozptylů**

**Podíl porovnávaných rozptylů**

# Dvouvýběrový t-test

## Testované hypotézy

- $H_0$  : BMI kuřáků a BMI nekuřáků se neliší  
BMI kuřáků – BMI nekuřáků = 0
- $H_1$  : BMI kuřáků a BMI nekuřáků se liší  
BMI kuřáků – BMI nekuřáků  $\neq$  0

# Dvouvýběrový t-test

## Vyhodnocení testu

- Testová statistika testu vychází

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \mu_0}{S} \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}} = \frac{25.95 - 26.98}{0.4126} \sqrt{\frac{109 \times 95}{109 + 95}} = -2.49$$

- porovnáme ji s kvantilem t-rozdělení  $t_{202}(1 - 0.025) = 1.97$
- jelikož  $|T| = 2.4966 > 1.97$  tak **nulovou hypotézu zamítáme**
- p-hodnota vyšla  $p = 0.01334 < 0.05 \Rightarrow$  zamítáme  $H_0$
- nakonec je potřeba ověřit normalitu v obou výběrech

**Závěr:** Na hladině významnosti 5% jsem prokázala, že BMI u kuřáků a nekuřáků se liší.

# Dvouvýběrový t-test

```
> t.test(BMI~Koureni, alternative='two.sided', conf.level=.95, var.equal=TRUE, data=Ichs)
```

Two Sample t-test

data: BMI by Koureni

t = -2.4966, df = 202, p-value = 0.01334

alternative hypothesis: true difference in means between group kouri and group nekouri is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-1.8405703 -0.2161728

sample estimates:

mean in group kouri mean in group nekouri

25.95205

26.98042

**Testová statistika**

**P-hodnota**

**Interval spolehlivosti pro rozdíl průměrů**

**Výběrový průměr nekuřáků**

**Výběrový průměr kuřáků**

# Analýza rozptylu – ANOVA

Porovnáváme-li střední hodnotu ve více než ve dvou nezávislých výběrech, používá se **analýza rozptylu**. Testujeme

- $H_0$  : všechny střední hodnoty jsou stejné
- $H_1$  : alespoň jedna střední hodnota se liší

Myšlenka spočívá v porovnání variability **mezi výběry** s variabilitou **v rámci výběrů**.

# Analýza rozptylu – ANOVA

Stejně jako u dvouvýběrového t-testu, budeme i zde brát dvě varianty analýzy rozptylu

- klasická analýza rozptylu (ANOVA) – pro shodné rozptyly ve všech výběrech
- Welchova verze analýzy rozptylu – pro různé rozptyly ve výběrech

**Předpokladem** obou těchto verzí ANOVY je normalita dat ve všech výběrech či ekvivalentně normalita residuí odpovídajícího lineárního modelu.

# Klasická ANOVA

Označme

- $X_{ij}$   $i$ -té pozorování z  $j$ -tého výběru
- $\bar{X}_i$  průměr  $i$ -tého výběru
- $\bar{X}_{..}$  celkový průměr všech pozorování
- $n_i$  rozsah  $i$ -tého výběru
- $k$  počet výběrů

Analýza rozptylu rozkládá celkovou variabilitu (čítatel rozptylu)

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_{..})^2$$

# Klasická ANOVA

## Rozklad variability na

- variabilitu vysvětlenou výběry (mezi výběry)  $SS_A$   
jedná se o rozdíl mezi skupinovými průměry
- variabilitu nevysvětlenou (zbytkovou, v rámci výběrů)  $SS_e$   
jedná se o odchylky od průměru v rámci jedné skupiny

$$\begin{aligned} SST &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_{..})^2 = \\ &= \sum_{i=1}^k n_i (\bar{X}_{i.} - \bar{X}_{..})^2 + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_{i.})^2 = \\ &= SSA + SSe \end{aligned}$$

# Klasická ANOVA

Výstupem z analýzy rozptylu je tzv. **tabulka analýzy rozptylu**

|                 | Součty<br>čtverců | Stupně<br>volnosti | Průměrné<br>čtverce      | Testová<br>statistika | <i>p</i> -hodnota |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| Faktor <i>A</i> | <i>SSA</i>        | $df_A = k - 1$     | $MSA = \frac{SSA}{df_A}$ | $F = MSA / MSe$       | <i>p</i>          |
| Chyba <i>e</i>  | <i>SSe</i>        | $dfe = n - k$      | $MSe = \frac{SSe}{dfe}$  |                       |                   |
| Celkem          | <i>SST</i>        | $dft = n - 1$      |                          |                       |                   |

Za platnosti nulové hypotézy má testová statistika *F*-rozdělení o  $k - 1$  a  $n - k$  stupních volnosti.

# Welchova ANOVA

Welchova ANOVA je založena na vážené variabilitě mezi výběry

$$F = \frac{\frac{1}{k-1} \sum_{j=1}^k w_j (\bar{X}_j - \bar{X}_w)^2}{1 + \frac{2(k-2)}{k^2-1} \sum_{j=1}^k \left( \frac{1}{n_j-1} \right) \left( 1 - \frac{w_j}{w} \right)^2}$$

kde

$$w_j = \frac{n_j}{s_j^2}, \quad w = \sum_{j=1}^k w_j, \quad \bar{X}_w = \frac{\sum_{j=1}^k w_j \bar{X}_j}{w}$$

Testová statistika má  $F$ -rozdělení o  $k - 1$  a  $\nu$  stupních volnosti

$$\nu = \frac{k^2 - 1}{3 \sum_{j=1}^k \left( \frac{1}{n_j-1} \right) \left( 1 - \frac{w_j}{w} \right)^2}$$

# Bartlettův test

Test shody rozptylů pro více než 2 rozptyly.

Testované hypotézy

- $H_0$  : rozptyly jsou shodné
- $H_1$  : rozptyly se liší

Označme  $\text{Var}(X_j)$  výběrový rozptyl v  $j$ -tém výběru a

$$S^2 = \frac{\sum_{j=1}^k (n_j - 1) \text{Var}(X_j)}{n - k},$$
$$C = 1 + \frac{1}{3(k-1)} \left( \sum_{j=1}^k \frac{1}{n_j - 1} - \frac{1}{n - k} \right)$$

Testová statistika Bartlettova testu

$$B = \frac{1}{C} \left( (n - k) \ln S^2 - \sum_{j=1}^k (n_j - 1) \ln \text{Var}(X_j) \right)$$

má za platnosti nulové hypotézy  $\chi^2$ -rozdělení o  $k - 1$  stupních volnosti.

# Párové srovnání

## Porovnání dvojic výběrů

- nelze pomocí dvouvýběrových testů – příliš roste chyba prvního druhu
- prostřednictvím tzv. **párového srovnání**
- nejčastěji **Tukeyho test**, respektive **Tukey HSD test** pro různě velké výběry

## Testované hypotézy

- $H_0$  : střední hodnoty  $\mu_i$  a  $\mu_j$  jsou stejné
- $H_1$  : střední hodnoty  $\mu_i$  a  $\mu_j$  se liší

# Párové srovnání

Testová statistika má tvar

$$Q = \frac{|\bar{X}_{i.} - \bar{X}_{j.}|}{s^*}, \text{ kde } s^* = \sqrt{\frac{SSe}{n(n-k)}}$$

Rozdělení těchto statistik se jmenuje studentizované rozpětí a má své vlastní tabelované kritické hodnoty. Vyhodnocení


- na základě p-hodnot nebo intervalů spolehlivosti pro rozdíly všech dvojic
- přestože ANOVA ukáže významný rozdíl mezi skupinami, nemusí se tento projevit v párovém srovnání

# Analýza rozptylu – ANOVA

**Příklad.** Byla měřena koncentrace mědi v těle ryb.

Porovnáváno bylo 5 rybníků, kde z každého byl vyloven vzorek 7-mi ryb. Výběrové průměry logaritmizované koncentrace mědi pro jednotlivé rybníky vyšly 0.57, 0.48, 0.50, -0.06 a 0.33. Liší se od sebe tyto rybníky?

Grafické porovnání středních hodnot



# Analýza rozptylu – ANOVA

Abychom mohli vybrat správnou verzi analýzy rozptylu, otestujeme nejprve shodu rozptylů ve všech výběrech. Tyto rozptyly vyšly postupně 0.10, 0.08, 0.10, 0.08 a 0.02.

Testujeme

- $H_0$  : rozptyly jsou shodné
- $H_1$  : rozptyly se liší

Testová statistika Bartlettova testu vyšla 3.67 při čtyřech stupních volnosti, což dává p-hodnotu 0.45. Jelikož je p-hodnota větší než  $\alpha = 0.05$ , **nulovou hypotézu nezamítáme** a můžeme použít klasickou ANOVU pro shodné rozptyly.

# Výstupy z R-ka

## Bartlettův test

```
> bartlett.test(lnCu ~ Misto, data=Anova2)
```

Bartlett test of homogeneity of variances

data: lnCu by Misto

Bartlett's K-squared = 3.6675, df = 4, p-value = 0.4529

**P-hodnota**

## Tabulka analýzy rozptylu

```
> summary(AnovaModel.1)
```

|           | Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F)     |
|-----------|----|--------|---------|---------|------------|
| Misto     | 4  | 1.796  | 0.4491  | 5.846   | 0.00127 ** |
| Residuals | 30 | 2.285  | 0.0762  |         |            |

---

Signif. codes: 0 '\*\*\*' 0.001 '\*\*' 0.01 '\*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

64 observations deleted due to missingness

**Součty čtverců**

**P-hodnota**

# Analýza rozptylu – ANOVA

## Testované hypotézy

- $H_0$  : všechny rybníky jsou stejné
- $H_1$  : alespoň jeden rybník se liší

## Tabulka analýzy rozptylu vyšla

|        | Součty<br>čtverců | Stupně<br>volnosti | Průměrné<br>čtverce | Testová<br>statistika | $p$ -hodnota |
|--------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Rybník | 1.796             | 4                  | 0.4491              | 5.896                 | 0.00127      |
| Chyba  | 2.285             | 30                 | 0.0762              |                       |              |
| Celkem | 4.081             | 34                 |                     |                       |              |

P-hodnota vyšla menší než  $\alpha = 0.05$ , což znamená, že **nulovou hypotézu zamítáme** a rybníky se mezi sebou významně liší. Nakonec je potřeba ověřit normalitu residuí nebo jednotlivých výběrů


# Analýza rozptylu – ANOVA

Párové srovnání vrátí následující tabulku

|            | rozdíl      | dolní mez   | horní mez  | p-hodnota        |
|------------|-------------|-------------|------------|------------------|
| B-A        | -0.08485714 | -0.51274077 | 0.3430265  | 0.9777112        |
| C-A        | -0.07314286 | -0.50102648 | 0.3547408  | 0.9871500        |
| <b>D-A</b> | -0.63114286 | -1.05902648 | -0.2032592 | <b>0.0015454</b> |
| E-A        | -0.23914286 | -0.66702648 | 0.1887408  | 0.4960690        |
| C-B        | 0.01171429  | -0.41616934 | 0.4395979  | 0.9999904        |
| <b>D-B</b> | -0.54628571 | -0.97416934 | -0.1184021 | <b>0.0070956</b> |
| E-B        | -0.15428571 | -0.58216934 | 0.2735979  | 0.8319549        |
| <b>D-C</b> | -0.55800000 | -0.98588362 | -0.1301164 | <b>0.0057762</b> |
| E-C        | -0.16600000 | -0.59388362 | 0.2618836  | 0.7920009        |
| E-D        | 0.39200000  | -0.03588362 | 0.8198836  | 0.0850175        |

# Analýza rozptylu – ANOVA

Graf pro párové srovnání. Pro kterou dvojici rybníků interval spolehlivosti neobsahuje svislou čárkovanou čáru (nulu), pak mezi ní je významný rozdíl.



**Závěr:** Rybníky se v koncentraci mědi v těle ryb významně liší, konkrétně se liší rybník D od rybníků A, B a C.

# Pearsonův korelační koeficient

Lineární vztah dvou číselných proměnných zkoumá **korelační koeficient**. **Pearsonův korelační koeficient** vypočteme jako

$$\text{Cor}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

Libovolný korelační koeficient nabývá hodnot mezi -1 a 1 a platí, že

- absolutní nepřímá závislost má  $\text{Cor}(X, Y) = -1$
- lineární nezávislost/ nekorelovanost má  $\text{Cor}(X, Y) = 0$
- absolutní přímá závislost má  $\text{Cor}(X, Y) = 1$

# Pearsonův korelační koeficient

O statistické významnosti závislosti rozhodujeme testem

- $H_0$  : korelační koeficient  $= 0$
- $H_1$  : korelační koeficient  $\neq 0$ ,  
     $H_1$  : korelační koeficient  $> 0$ ,  
     $H_1$  : korelační koeficient  $< 0$

Za platnosti nulové hypotézy platí, že testová statistika

$$T = \frac{\text{Cor}(X, Y)}{\sqrt{1 - \text{Cor}(X, Y)^2}} \sqrt{(n - 2)}$$


má  $t$ -rozdělení o  $n - 2$  stupních volnosti.

**Předpokladem** použití Pearsonova korelačního koeficientu je normalita obou prpoměnných

# Pearsonův korelační koeficient

**Příklad.** Výzkumu se účastnilo 204 mužů s jedním rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční, u nichž byly měřeny fyzické údaje. Souvisí spolu výška a hmotnost těchto mužů?

Nejprve grafické porovnání



Z grafu je patrná rostoucí závislost mezi oběma proměnnými.

# Pearsonův korelační koeficient

## Testované hypotézy

- $H_0$  : váha a výška spolu nesouvisí, korelační koeficient = 0
- $H_1$  : váha a výška spolu souvisí, korelační koeficient  $\neq 0$

Korelační koeficient vyšel 0,5 a testová statistika

$$T = \frac{\text{Cor}(X, Y)}{\sqrt{1 - \text{Cor}(X, Y)^2}} \sqrt{(n - 2)} = \frac{0.5}{\sqrt{1 - 0.25}} \sqrt{202} = 8.19.$$

Testová statistika je větší než kvantil t-rozdělení

$t_{202}(1 - 0.975) = 1.97$ . P-hodnota testu vyšla  $2.926 \times 10^{-14}$ , což je menší než  $\alpha = 0.05$ . **Nulovou hypotézu tedy zamítáme.**

**Závěr:** Závislost mezi váhou a výškou je průkazná a přímá.

Nakonec je potřeba ověřit normalitu obou proměnných.

# Pearsonův korelační koeficient

```
> with(Ichs, cor.test(hmot, vyska, alternative="two.sided", method="pearson"))
```

Pearson's product-moment correlation

data: hmot and vyska

t = 8.1904, df = 202, p-value = 2.926e-14

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0

95 percent confidence interval:

0.3885799 0.5958041

sample estimates:

cor

0.4992987

**Testová statistika**

**P-hodnota**

**Interval spolehlivosti pro  
korelační koeficient**

**Výběrový korelační koeficient**

# Lineární regrese

Vztah mezi dvěma spojitými proměnnými lze hodnotit i z pohledu **lineární regrese**, která zkoumá příčinnou závislost. V tomto případě máme

- **nezávisle proměnnou**  $X$  – příčinu
- **závisle proměnnou**  $Y$  – důsledek

Výsledkem je odhad lineárního modelu ve tvaru

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + e_i$$

kde

- $Y_i$  jsou hodnoty závisle proměnné
- $X_i$  jsou hodnoty nezávisle proměnné
- $\beta_0$  je absolutní člen
- $\beta_1$  je lineární člen
- $e_i$  jsou náhodné chyby

# Lineární regrese

Graficky popisujeme pomocí bodového grafu, ale není jedno, která proměnná je na které ose

- na x-ovou osu se kreslí nezávisle proměnná
- na y-ovou osu se kreslí závisle proměnná

Odhad probíhá **metodou nejmenších čtverců**, která minimalizuje součet druhých mocnin residuí

$$\min \sum_{i=1}^n R_i^2 = \min \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 = \min_{b_0, b_1} \sum_{i=1}^n (Y_i - (b_0 + b_1 X_i))^2$$

- $\hat{Y}_i$  se nazývají odhady, nebo též predikce
- $b_0, b_1$  jsou odhady regresních koeficientů
- pomocí modelu je možné predikovat budoucí hodnoty závisle proměnné

# Koeficient determinace

Často nazývaný *R-squared*

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2} = \text{cor}(X, Y)^2$$

- ukazatel kvality modelu
- procento variability závisle proměnné vysvětlené modelem  
tj. z kolika procent závisí  $Y$  na  $X$  a z kolika na něčem jiném

# Regresní koeficienty

## Interpretace regresních koeficientů

- $b_0$  – kde protíná regresní přímka  $x$ -ovou osu  
– kolik by vyšlo  $Y$ , kdyby  $X$  bylo 0
- $b_1$  – o kolik se v průměru změní závisle proměnná  $Y$ , když se nezávisle proměnná  $X$  zvýší o 1

## Test nezávislosti

- $H_0 : Y$  na  $X$  lineárně nezávisí,  $\beta_1 = 0$
- $H_1 : Y$  na  $X$  lineárně závisí,  $\beta_1 \neq 0$

Test je založen na faktu, že  $b_1 / \text{se}(b_1) \sim N(0, 1)$ , kde  $b_1$  je odhad lineárního členu  $\beta_1$  a  $\text{se}(b_1)$  je jeho střední chyba.

- test vychází stejně jako u korelačního koeficientu

# Lineární regrese





I lineární regrese má své **předpoklady**

- Mezi proměnnými je skutečně lineární vztah
- Residua jsou nezávislá
- Residua mají normální rozdělení
- Stabilita rozptylu residuí
- V datech nejsou vlivná pozorování

Jednotlivé předpoklady můžeme hodnotit buď na základě znalosti dat (nezávislost), nebo grafickými případně číselnými testy.

# Lineární regrese

## Ukázka grafických testů předpokladů



# Lineární regrese

Ukázka grafických testů předpokladů

- **1. graf:** lineární vztah – červená čára nemá mít trend
- **2. graf:** normalita residuí – body mají ležet na přímce
- **3. graf:** stabilita rozptylu – červená čára nemá mít trend
- **4. graf:** body nemají překročit meze (čárkované křivky)

# Lineární regrese

**Příklad.** Pokračujme příkladem závislosti hmotnosti na výšce u mužů s jedním rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční.

Odhadli jsme model ve tvaru

$$Y_i = -66.85 + 0.85X_i$$

- se( $b_1$ ) vyšla 0.1 , testová statistika 8.19, kvantil t-rozdělení  $t_{202}(1 - 0.975) = 1.97$
- koeficient determinace je  $R^2 = 0.25$
- p-hodnota testu vyšla  $2.93 \times 10^{-14} < \alpha = 0.05$
- tedy **zamítáme nulovou hypotézu**

**Závěr:** U mužů s jedním rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční závisí hmotnost na výšce. Závislost je přímá a vysvětlí se jí 25% variability závisle proměnné.

# Lineární regrese

```
> summary(RegModel.2)
```

Call:

```
lm(formula = hmot ~ vyska, data = Ichs)
```

Residuals:

| Min     | 1Q     | Median | 3Q    | Max    |
|---------|--------|--------|-------|--------|
| -19.410 | -6.362 | -0.264 | 5.372 | 32.972 |

Coefficients:

|             | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t )     |
|-------------|----------|------------|---------|--------------|
| (Intercept) | -66.8494 | 18.1990    | -3.673  | 0.000387 *** |
| vyska       | 0.8455   | 0.1032     | 8.190   | 2.93e-14 **  |

Signif. codes: 0 '\*\*\*' 0.001 '\*\*' 0.01 '\*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 9.222 on 202 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.2493, Adjusted R-squared: 0.2456

F-statistic: 67.08 on 1 and 202 DF, p-value: 2.926e-14

**Regresní koeficienty**

**P-hodnota**

**Koeficient determinace**

# Test dobré shody

Kategorická proměnná s více než dvěma kategoriemi má tzv. **Multinomické rozdělení**. Jedná se o zobecnění binomického rozdělení.

Označme

- $k$  počet kategorií, kterých může náhodná veličina nabývat
- $n$  počet pokusů pokus/ pozorování
- $X_1, \dots, X_k$  počty, kolikrát nastala která kategorie v  $n$  pokusech

Pravděpodobnosti multinomického rozdělení jsou

$$P(X_1 = n_1, \dots, X_k = n_k) = \frac{n!}{n_1! \cdot \dots \cdot n_k!} p_1^{n_1} \cdot \dots \cdot p_k^{n_k}$$

Střední hodnota a rozptyl

$$E(X_i) = np_i, \quad \text{Var}(X_i) = np_i(1 - p_i)$$

# Test dobré shody

Test o hodnotách jednotlivých pravděpodobností.

Testované hypotézy

- $H_0 : p_1 = \pi_1, \dots, p_k = \pi_k$
- $H_1 : \text{neplatí } p_1 = \pi_1, \dots, p_k = \pi_k$

Testová statistika má tvar

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n\pi_i)^2}{n\pi_i}$$

- za platnosti nulové hypotézy má  $\chi^2$ -rozdělení o  $k - 1$  stupních volnosti
- předpokladem je, že všechny očekávané četnosti, tj. hodnoty  $n\pi_i$ , jsou větší než 5.

Tímto testem je možné testovat i konkrétní rozdělení veličiny.

# Test dobré shody

**Příklad.** *Házíme 50 krát šestistěnnou kostkou a počítáme, kolikrát padla která hodnota. Jednička padla 8 krát, dvojka 5 krát, trojka 12 krát, čtyřka 7 krát, pětka 9 krát a šestka také 9 krát. Můžeme o kostce říci, že je spravedlivá?*

*Testujeme hypotézy*

- $H_0 : p_1 = p_2 = \dots = p_6 = 1/6$
- $H_1 : \text{alespoň jedna z pravděpodobností } p_1, \dots, p_6 \text{ se nerovná } 1/6.$

*Test porovnává*

- *pozorované četnosti*  
 $n_1 = 8, n_2 = 5, n_3 = 12, n_4 = 7, n_5 = 9, n_6 = 9$
- *očekávané četnosti*  $n\pi_i = 50 \times 1/6 = 8.3333.$

# Test dobré shody

## Příklad. Testová statistika

$$\begin{aligned} \chi^2 = & \frac{(8 - 8.3333)^2}{8.3333} + \frac{(5 - 8.3333)^2}{8.3333} + \frac{(12 - 8.3333)^2}{8.3333} + \\ & + \frac{(7 - 8.3333)^2}{8.3333} + \frac{(9 - 8.3333)^2}{8.3333} + \frac{(9 - 8.3333)^2}{8.3333} = 3.28 \end{aligned}$$

- kritická hodnota  $\chi^2$ -rozdělení o 5-ti st. volnosti je  $\chi^2_5 = 11.07$
- $p$ -hodnota vyšla  $p = 0.6569$
- testová statistika  $X^2 < \chi^2_5$  a  $p$ -hodnota  $< \alpha$
- tedy **nezamítáme nulovou hypotézu**

**Závěr:** *Neprokázali jsme, že by kostka byla falešná.*

# $\chi^2$ -test nezávislosti

Vztah dvou kategorických proměnných popisujeme **tabulkou absolutních četností**. Označme

- $X_1, \dots, X_k$  hodnoty jedné kategorické proměnné
- $Y_1, \dots, Y_l$  hodnoty druhé kategorické proměnné
- $n_{i,j}$  četnost současného výskytu znaků  $X_i, Y_j$
- $n_{i.}$  marginální četnost znaku  $X_i$
- $n_{.j}$  marginální četnost znaku  $Y_j$
- $n$  celkový počet pozorování

$\chi^2$ -test nezávislosti

Obecná kontingenční tabulka absolutních četností má tvar

|          | $Y_1$     | $\dots$  | $Y_c$     |          |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| $X_1$    | $n_{1,1}$ | $\dots$  | $n_{1,c}$ | $n_{1.}$ |
| $\vdots$ |           | $\ddots$ |           | $\vdots$ |
| $X_r$    | $n_{r,1}$ | $\dots$  | $n_{r,c}$ | $n_{r.}$ |
|          | $n_{.1}$  | $\dots$  | $n_{.c}$  | $n$      |

Hodnoty uvedené v tabulce jsou tzv. *pozorované četnosti*.

# $\chi^2$ -test nezávislosti

Test je založen na porovnání

- pozorovaných četností v tabulce
- očekávaných četností za platnosti nulové hypotézy

Testované hypotézy

- $H_0$  : proměnné na sobě nezávisí
- $H_1$  : proměnné na sobě závisí

Testová statistika má tvar

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l \frac{(\text{pozorovane}_{i,j} - \text{ocekavane}_{i,j})^2}{\text{ocekavane}_{i,j}} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l \frac{(n_{i,j} - n_{i.}n_{.j}/n)^2}{n_{i.}n_{.j}/n}$$

- za platnosti nulové hypotézy má  $\chi^2$ -rozdělení o  $(k-1)(l-1)$  stupních volnosti
- očekávané četnosti odpovídají definici nezávislosti  
 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

# Fisherův exaktní test

Pro malé četnosti se používá **Fisherův exaktní test**

- není-li splněn předpoklad  $\chi^2$ -testu, tj. některé očekávané četnosti jsou menší než 5
- počítá přímo p-hodnotu, tj. pravděpodobnost, že za platnosti  $H_0$  bude pozorována právě naše tabulka četností

Pro čtyřpolní tabulku

|       | $Y_1$    | $Y_2$    |          |
|-------|----------|----------|----------|
| $X_1$ | $n_{11}$ | $n_{12}$ | $n_{1.}$ |
| $X_2$ | $n_{21}$ | $n_{22}$ | $n_{2.}$ |
|       | $n_{.1}$ | $n_{.2}$ | $n$      |

se p-hodnota vypočítá následujícím způsobem

$$p = \frac{n_{1.}!n_{2.}!n_{.1}!n_{.2}!}{n!n_{11}!n_{12}!n_{21}!n_{22}!}$$

Pro větší tabulky je test složitější.


# $\chi^2$ -test nezávislosti

**Příklad.** U 204 mužů s jedním rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční bylo zjišťováno i vzdělání a kategorie kouření. Výsledky jsou shrnuty v následující tabulce absolutních četností. Souvisí spolu tyto dvě veličiny?

|              | ZŠ | SŠ | VŠ |
|--------------|----|----|----|
| bývalý kuřák | 6  | 10 | 11 |
| nekuřák      | 13 | 22 | 23 |
| slabý kuřák  | 52 | 39 | 18 |
| silný kuřák  | 6  | 1  | 3  |

# $\chi^2$ -test nezávislosti

Vztah dvou kategoričkových proměnných se zobrazuje pomocí sloupcového grafu



Můžeme zobrazovat pomocí řádkových nebo sloupcových procent.

# $\chi^2$ -test nezávislosti

Testem nezávislosti jsme zjišťovali

- $H_0$  : kouření se vzděláním nesouvisí
- $H_1$  : kouření se vzděláním souvisí

Výsledky testu

- testová statistika  $\chi^2$ -testu vyšla 21.286
- kvantil  $\chi^2$ -rozdělení  $\chi^2_6 = 12.59$
- p-hodnota testu vyšla 0.00163
- **ale nejsou splněny předpoklady  $\chi^2$ -testu**
- p-hodnota Fisherova exaktního testu 0.00084
- p-hodnota  $< \alpha$  tedy **zamítáme nulovou hypotézu**

**Závěr:** Prokázali jsme, že kouření se vzděláním souvisí.

# Lineární regrese

```
> local({  
  + ...  
  + })
```

Frequency table:

|         | Vzdel |    |    |  |
|---------|-------|----|----|--|
| Kour    | SS    | VS | ZS |  |
| byvaly  | 10    | 11 | 6  |  |
| nekurak | 22    | 23 | 13 |  |
| silny   | 39    | 18 | 52 |  |
| slaby   | 1     | 3  | 6  |  |

V okně Messages informace  
o splnění předpokladů

**Tabulka absolutních četností**

Pearson's Chi-squared test

data: .Table

X-squared = 21.286, df = 6, p-value = 0.00163

**P-hodnota chí-  
kvadrát testu**

Fisher's Exact Test for Count Data

data: .Table

p-value = 0.00084

**P-hodnota Fisherova testu**

alternative hypothesis: two.sided

# Poměr šancí

Uvažujme dvouhodnotovou veličinu ve dvou populacích. Např. sledujeme výskyt chřipky ve městě a na venkově.

|        | Chřipku má | Chřipku nemá |          |
|--------|------------|--------------|----------|
| Město  | $n_{11}$   | $n_{12}$     | $n_{1.}$ |
| Venkov | $n_{21}$   | $n_{22}$     | $n_{2.}$ |
|        | $n_{.1}$   | $n_{.2}$     | $n$      |

Rozdíl mezi populacemi je možné popsat poměrem šancí. Nejprve definujme **šanci** "mít chřipku proti nemít chřipku" jako

$$Odds = \frac{P(\text{má chřipku})}{P(\text{nemá chřipku})}$$

Poměr šancí je pak podíl této šance v jedné populaci ku šanci v druhé populaci.

## Poměr šancí

Pro naši tabulku je pak **poměr šancí** definovaný jako

$$OR = \frac{n_{11}n_{22}}{n_{12}n_{21}}$$

Interpretace tohoto poměru říká, kolikrát je větší šance na chřipku ve městě než na venkově.

Pokud chceme otestovat, že šance na chřipku jsou stejné ve městě jako na venkově, testujeme

- $H_0$  : poměr šancí  $OR = 1$
- $H_1$  : poměr šancí  $OR \neq 1$

Testová statistika tohoto testu je rovna

$$Z = \frac{\ln(OR)}{\sqrt{\frac{1}{n_{11}} + \frac{1}{n_{12}} + \frac{1}{n_{21}} + \frac{1}{n_{22}}}}$$

a za platnosti nulové hypotézy má  $N(0, 1)$  rozdělení.

# Poměr šancí

Pro poměr šancí je možné spočítat i **interval spolehlivosti**

$$\ln(OR) \pm \left( \sqrt{\frac{1}{n_{11}} + \frac{1}{n_{12}} + \frac{1}{n_{21}} + \frac{1}{n_{22}}} \right) z(\alpha/2).$$

Co je možné tímto intervalem zjistit?

Např. můžeme vyhodnocovat, zda se tento poměr může rovnat nějaké konkrétní hodnotě.

# Poměr šancí

**Příklad.** Uvažujme následující čtyřpolní tabulku

|        | Chřipku má | Chřipku nemá |     |
|--------|------------|--------------|-----|
| Město  | 58         | 17           | 75  |
| Venkov | 32         | 30           | 62  |
|        | 90         | 47           | 137 |

Šance mít chřipku ve městě vychází  $58/17 = 3.41$ , šance mít chřipku na venkově vychází  $32/30 = 1.07$ . Poměr šancí ve městě vs. na venkově vychází  $3.41/1.07 = 3.2$ . *Ve městě je více než třikrát větší šance mít chřipku než na venkově.*

Testová statistika vychází 3.27, kritická hodnota 1.96 a p-hodnota 0.001. Testová statistika je větší než kritická hodnota a p-hodnota je menší než  $\alpha$ , **zamítáme nulovou hypotézu.**

**Závěr:** *Ve městě je významně větší šance dostat chřipku než na venkově.*

# Poměr šancí

```
> fisher.test(.Table)
```

Fisher's Exact Test **for** Count Data

data: .Table

p-value = 0.00208

**P-hodnota**

alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1

95 percent confidence interval:

1.444080 7.155019

**Interval spolehlivosti pro poměr šancí**

sample estimates:

odds ratio

3.170026

**Poměr šancí**